

**La flore : une première indication des différents types possibles
d'amélioration ou de rénovation de la prairie**

Pourcentage de dicotylédones indésirables et de mousses	% de bonnes graminées + légumineuses herbacées		
	Moins de 30 %	30 à 70 %	Plus de 70 %
Moins de 15 %	<ul style="list-style-type: none"> - Exploitation (pâturage précoce, éviter le surpâturage, éviter une herbe trop haute à l'entrée de l'hiver) - Fertilisation à raisonner - Ressemis si possible ou sursemis d'espèces adaptées aux objectifs de production et aux contraintes pédoclimatiques. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exploitation (pâturage précoce, éviter le surpâturage, éviter une herbe trop haute à l'entrée de l'hiver - Fertilisation à raisonner. 	Bonne prairie
15 à 30 %	<ul style="list-style-type: none"> - Exploitation (pâturage précoce, éviter le surpâturage, éviter herbe trop haute à l'entrée de l'hiver) - Fertilisation à raisonner - Ressemis si possible ou sursemis d'espèces adaptées aux objectifs de production et aux contraintes pédoclimatiques - Désherbage sélectif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exploitation (pâturage précoce, éviter le surpâturage, éviter herbe trop haute à l'entrée de l'hiver). - Fertilisation à raisonner. - Désherbage sélectif éventuel. - Sursemis après désherbage sélectif. 	Bonne prairie, désherbage sélectif éventuel
Plus de 30 %	<ul style="list-style-type: none"> - Ressemis d'espèces adaptées aux objectifs de production et aux contraintes pédoclimatiques. 	<ul style="list-style-type: none"> - Désherbage sélectif - Sursemis après désherbage sélectif. 	X